

Fastac® 50

Insekticīds kaitēkļu ierobežošanai graudaugu, rapša, kartupeļu, lucernas, zirņu, pupu, cukurbiešu un lopbarības biešu, kukurūzas, āboliņa un stiebrzāļu sēklu laukos, linu, ķimeņu, burkānu, kāpostu, ziedkāpostu, sīpolu, puravu, ķiploku, sakņu dārzeņu, diļļu sēklu laukos un sakņu pētersīļu sējumos, zemeņu, aveņu, jāņogu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, gurķu, tomātu un krāšņumaugu stādījumos, zālienos, golfa laukumos, mežsaimniecībā un noliktavās

Reģistrācijas Nr.	0250
Reģistrācijas klase:	2.
Darbīgās vielas:	alfa-cipermetrīns 50 g/l
Formulācija:	emulsijas koncentrāts
Iepakojums:	0,1 l ; 1 l ; 5 l

Preparāta apraksts

Fastac 50 ir sintētisko piretroīdu grupas augsti efektīvs un ātri iedarbīgs plaša spektra pieskares insekticīds, kas iznīcina lielāko daļu kaitēkļu laukos, dārzos, mežos un noliktavās. Preparāts kaitēkļus iznīcina, nonākot saskarē vai, ja tie ieēd apstrādāta auga daļas. Fastac 50 piemīt arī repelentas īpašības. Optimālos apstākļos Fastac 50 pasargā augus no kaitēkļiem pat līdz

3 nedēļām. Nonākot uz augiem, preparāts ātri adsorbējas vaska kārtiņā, kas klāj lapu virsmu, un to nenoskalo lietus.

Preparāts augos nepārvietojas, tādēļ, lai sasniegtu augstu efektivitāti, smidzinot nepieciešams vienmērīgi noklāt visu augu. Lai nodrošinātu iespējami ilgāku aizsardzību, jālieto lielākās reģistrētās Fastac 50 devas.

Lietošana

Fastac 50 var lietot profilaktiski, ņemot vērā prognozes, vai arī tad, kad novērota kaitēkļu parādīšanās.

Kultūra	Deva, l/ha	Ierobežojamie kaitēkļi	Lietošanas laiks	Nogaidīšanas laiks
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	0,2–0,4	spradži, labību laputs, labību lapgrauži, ievu-auzu laputs	Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
	0,2–0,4	tripši	Graudaugu stiebrošanas stadijā, pirms vārpošanas	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
	0,4	melnā stiebrmuša	Graudaugu 1,5–2 lapu stadijā	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā

Kultūra	Deva, l/ha	Ierobežojamie kaitēkļi	Lietošanas laiks	Nogaidīšanas laiks
Rapsis	0,2–0,3	spradži, smecernieki, krustziežu spīdulis	Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Kartupeļi	0,2–0,4	kartupeļu lapgrauzis, laputis	Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Lucerna	0,2–0,4	lucernas smecernieks, svītrainais zirņu smecernieks, laputis, lucernas blakts	Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 3 reizes sezonā
Cukurbietes, lopbarības bietes	0,2–0,4	biešu spradzis, biešu muša, pupu laputs	Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 3 reizes sezonā
Āboliņa sēklu lauki	0,2–0,4	smecernieki	Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki	0,4–0,6	graudzāļu ērce	Apsmidzināt sējumus pavasarī, tikko stiebrzāles sadīgušas	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
	0,4–0,6	timotiņa muša	Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
	0,4	melnā stiebrmuša	Apsmidzināt sējumus stiebrzāļu 1,5–2 lapu stadijā	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Lini	0,2–0,4	tripši, melnais līnu spradzis, zilais līnu spradzis	Apsmidzināt sējumus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 3 reizes sezonā
Kukurūza	0,4	melnā stiebrmuša	Apstrādāt sējumus 1,5–2 lapu stadijā	14 dienas Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Kāposti, ziedkāposti	0,2–0,4	krustziežu spradži, kāpostu baltenis, rāceņu baltenis, kāpostu pūcite, kāpostu cekulkode, krustziežu zāglapsene, kāpostu laputs	Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Zirņi, pupas	0,2–0,4	svītrainais zirņu smecernieks, zirņu laputs, pupu laputs, zirņu tinējs	Apsmidzināt platības, kaitēklīm parādoties	21 diena Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Burkāni	0,3–0,4	burkānu muša	Apsmidzināt platības, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā

Kultūra	Deva, l/ha	Ierobežojamie kaitēkļi	Lietošanas laiks	Nogaidīšanas laiks
Burkāni, ķīmenes	0,3–0,4	burkānu lapu blusiņa	Apsmidzināt sējumus kultūrauga 1. isto lapu pāra stadijā	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši	0,4–0,5	ābeļu lapu un pumpuru tinēji, rožu lapu tinējs, ābeļu zaļā un pelēkā laputs, ābeļu lapu blusiņa, ābeļu ziedu smecernieks, ābolu tinējs	Apsmidzināt augļu kokus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi atklātā laukā	0,4–0,6	tabakas un dzeltenais tripsis, persiku laputs, augu māju raibā laputs, alotājmuša	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 3 reizes sezonā
Gurķi, tomāti, krāšņumaugi slēgtās platībās	4–6 ml/100 m ²	tabakas un dzeltenais tripsis, persiku laputs, augu māju raibā laputs, alotājmuša, siltumnicu baltblusiņa	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	3 dienas Atļauts lietot 3 reizes sezonā
Avenes, zemenes, jānogas	0,3–0,4	avenu ziedu smecernieks, laputis, avenāju vabole	Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pirms ziedēšanas vai kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Sīpoli, puravi, ķiploki	0,3–0,4	sīpolu lakstu puskode, sīpolu ziedmuša	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Sakņu dārzeni	0,3–0,4	pūcītes, biešu spradzis, svitrainais spradzis, biešu muša, krustziežu zāglapsene	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 2 reizes sezonā
Dilles sēklai, sakņu pētersijī	0,2–0,4	laputis	Apsmidzināt kultūraugus, kaitēklīm parādoties	14 dienas Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Zāliens golfa laukumā	0,4	majivabole, jūnijvabole, jūlijvabole, dārza vabole, sprakšķi, skudras	Apsmidzināt zālienu, kaitēklīm parādoties	Apstrādāt vakarā pēc laukuma izmantošanas. Spēlētāji zālienu var atsākt izmantot nākamās dienas rītā. Atļauts lietot 3 reizes sezonā
Noliktavu telpu dezinfekcija	0,4 ml/m ²	smecernieki, miltu sviļņi, mazais miltu melnulis, zobkakla plankis	Darba šķīduma patēriņš 200 ml/m ²	20 dienas Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Lapu koki kokaudzētāvās	0,2–0,3	mazais salnas sprizmetis, ozolu tinējs	Apsmidzināt stādījumus, kaitēklīm parādoties	Atļauts lietot 1 reizi sezonā

Kultūra	Deva, l/ha	Ierobežojamie kaitēkļi	Lietošanas laiks	Nogaidīšanas laiks
Skuju koki kokaudzētavās	2,5–3,5% preparāta darba šķīdums	priežu smecernieki	(0,25–0,35 l uz 10 l ūdens). Iemērt stādus šķīdumā pirms izstādīšanas	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
	0,2–0,3	priežu vērpējs, egļu mūkene, rūsganā priežu zāglapsene	Apsmidzināt stādījumus, kaitēklim parādoties	Atļauts lietot 1 reizi sezonā
Koksne	1–3% preparāta darba šķīdums	egļu astonzobu mizgrauzis	(0,1–0,3 l uz 10 l ūdens). Apstrādā koksni krautuvēs, lietojot 250 ml/m ² . Svarīgi ir rūpīgi noklāt visu koksnes virsmu	Atļauts lietot 1 reizi sezonā

Bīstams bitēm! Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, kā arī vietās, kur bites aktīvi meklē barību, insekticīdu lietot pēc plkst. 22:00 un pirms plkst. 5:00!

Tvertnes maisījumi: Fastac 50 drīkst lietot maisījumos ar augšanas regulatoriem, herbicīdiem, fungicīdiem, citiem insekticīdiem, kā arī ar lapu mēslojumu.

Ieteicamais darba šķīduma daudzums:

Lauka kultūrās 200–400 l/ha. Lielāko ūdens daudzumu lieto, ja augiem ir bieža lapotne, kā arī pie augstākām temperatūrām.

Augļu dārzos 2000–2500 l/ha, ogulājos 1000 l/ha, krāšņumaugos līdz 2000 l/ha darba šķīduma.

Briesmas!

H226, H301, H304, H317, H319, H335, H336, H410, EUH066, EUH401, P210, P240, P241, P242, P243, P260, P271, P280, P301+P310, P330, P331, P303+P361+P353, P333+P313, P304+P340, P362+P364, P370+P378, P391, P233, P501, SP1, SPe3, SPe8*