

Lietošanas ieteikumi




Darbīgās vielas:	200 g/l dimetēnamīds-P 200 g/l metazahlor 40 g/l klomazons
Formulācija:	kapsulētā suspensija (CS)
Reģistrētā deva:	2,0–2,5 l/ha
Ieteicamais darba šķiduma daudzums:	100–400 l/ha
Kultūra:	ziemas rapsis
Apstrādes laiks:	līdz rapša sadīgšanai (AS 00–09)
Nezāļu spektrs:	īsmūža viendīgļlapji un divdīgļlapji

Lai sasniegtu maksimālu Nimbus® Gold efektivitāti, svarīgi veikt kvalitatīvu augsnes apstrādi un novērst cīlu veidošanos. Liels salmu un citu augu atlieku daudzums augsnes virskārtā var samazināt herbicīda efektivitāti.

Apstrāde ar Nimbus® Gold jāveic pirms rapša sadīgšanas, 2–3 dienu laikā pēc sējas.

- **Inovātīva formulācija – saudzīga kultūraugiem**
- **Uzticama un plaša nezāļu spektra ierobežošana**
- **Pārliecinoša krustziežu nezāļu kontrole**
- **Augsts darbīgo vielu saturs – elastīga devu pielietošana**
- **Efektivitāte mazāk atkarīga no augsnes mitruma**
- **Mūsdienīgs herbicīds efektīvai un ilgtspējīgai lauksaimniecībai**

Nimbus® Gold efektivitāte ziemas rapša sējumos ar devu 2,5 l/ha



Avots: BASF dati

BASF
We create chemistry

BASF Crop Protection

Lambertu iela 33 B
Mārupe, LV 2167, Latvija
Tālruni: 67 508 250
67 893 555
67 893 556

www.agro.basf.lv

Lejuplādē mobilo lietotni!
„Agronoma palīgs”



Nimbus® Gold

Zelta godalga nezāļu ierobežošanā!

BASF
We create chemistry


Nimbus® Gold

Nimbus® Gold ir viens no jaunākajiem preparātiem BASF rapšu herbicīdu klāstā. Tā sastāvā ir darbīgā viela – dimetēnamīds-P apvienojumā ar metazahloru, kas kopā veido unikālo “Kombi efektu”. Salīdzinot ar tradicionālajiem rapša herbicīdiem, Nimbus® Gold sastāvā esošo darbīgo vielu kombinācija nodrošina efektīvu, optimālu un kultūraugiem saudzīgu nezāļu ierobežošanu.

Preparāta formulācija

Nimbus® Gold ir pieejams kapsulētas suspensijas formā. Pēc apstrādes kapsulas augsnē nepārtraukti un vienmērīgi izdala darbīgās vielas, nodrošinot ilgstošu iedarbību un izcilu augu drošību mainīgos klimata apstākļos. Klomazons kapsulu suspensijas formā ir daudz saudzīgāks pret rapsi, nodrošinot zemu fitotoksiskuma risku.

Nimbus® Gold ir pieejams *Eco Pack* iesaiņojumā ērtai un ātrai uzpildei un skalošanai.



Darbīgās vielas	g/l	g/ha (2,5 l)	ķīmiskā grupa	HRAC kods
Dimetēnamīds-P	200	500	Hloracetamīns	K3
Metazahloru	200	500	Hloracetamīns	K3
Klomazons	40	100	Oksazolidons	F3

HRAC = **H**erbicide **R**esistance **A**ction **C**ommittee
(Herbicīdu Rezistences Rīcības komiteja)


Kāpēc jāierobežo krustziežu nezāles?

Pieaugot sakņu augoņu izplatībai rapša sējumos, ir būtiski ierobežot krustziežu nezāles (žodzene, ārstniecības; naudulis, tīruma; plikstiņš, parastais; pērkone, tīruma u.c.), jo tās ir saimniekaugi šim patogēnam. Īpaši tas attiecas uz sējumiem, kuros augsne ir skāba, blīva jeb pārmitra, vai rapsis tiek sēts biežāk nekā reizi četros gados.

Augsta efektivitāte pie dažādām devām

Dimetēnamīda-P klātbūtne preparātā un kapsulētā, modernā formulācija nodrošina elastīgāku produkta devu lietošanu, kā arī paplašina ierobežojamo nezāļu spektru t.sk.: gandrēnes sugas; madaru, ķeraīņu; magoni, zīda, kā arī virkni krustziežu nezāles.

- Nimbus® Gold 2,5 l/ha
- Nimbus® Gold 2,0 l/ha



Kombi efekts

Herbicīdu efektivitāte pie dažāda nokrišņu daudzuma








Diagramma ilustrē, kā dimetēnamīds-P papildina metazahloru efektivitāti pie dažāda nokrišņu daudzuma.


Salmu atlieku daudzuma ietekme uz herbicīdu efektivitāti




Salīdzinot tikai ar metazahloru saturošiem preparātiem, metazahloru un dimetēnamīda-P sinerģija jeb “Kombi efekta” iedarbība ir mazāk atkarīga no salmu atlieku daudzuma.



”Kombi efekts” nodrošina uzticamu, stabilu un pārliecinošu efektivitāti nezāļu ierobežošanā. Herbicīda efektivitāte ir mazāk atkarīga no augsnes mitruma un augsnes tipa gadījumos, kad augsnes mitrums var būt ierobežojošais faktors herbicīdu efektivitātei.



Metazahloru (1000 g/ha)



Metazahloru (500 g/ha) + Dimetachlor (500 g/ha)

- Darbīgo vielu uzņemšana caur dažādām auga daļām
- Efektīva izplatīšanās nezāļu aktivajā dīgšanas zonā
- Plašāka nezāļu spektra ierobežošanas un augstāka efektivitāte