

HiStick® sojas pupiņām



Pieejams tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma. Lūdzu sazināties ar BASF agronomu!

Inokulants sojas sēklu apstrādei

Darbīgās vielas:	<i>Rhizobium Bacteria</i> (<i>Bradyrhizobium japonicum</i>)
Iepakojums:	400 g

Preparāta apraksts

HiStick ir inokulants, kas iestrādāts kūdras substrātā. Produkts satur dzīvotspējīgas baktērijas *Rhizobium Bacteria*. Šīs baktērijas spēj brīvi dzīvot augsnē un veidot simbiotiskas attiecības ar tauriņziežiem.

Rhizobium Bacteria augā iekļūst caur sakņu spurgaliņām un spēj vairoties tauriņziežu šūnās. Baktēriju ietekmē saknē esošās šūnas dalās un veido gumiņus, kas spēj fiksēt gaisā esošo slāpekli un nodrošināt ar to augu.

Lietošana

Iepakojuma saturs ir paredzēts līdz 100 kg sojas sēklu apstrādei. Iesakām HiStick devu dubultot, ja laukā pirmo reizi tiek sēta soja. Palielināta preparāta deva neietekmēs laukaugu attīstību.

Ir 3 dažādi apstrādes paņēmieni:

- **Tiešā apstrāde:** HiStick nepieciešams uzbērt plānai sēklu kārtai (aptuveni 7–15 cm) sējmašīnā un samaisīt. Ja gadījumā sējmašīna tiek uzpildīta mehāniski, tad inokulants uz sēklas materiāla nokļūs nevienmērīgi, tāpēc ieteicams samaisīt to vēlreiz.
- **Maisījumā ar ūdeni:** pievienot sēklas materiālam tik daudz ūdens, lai tās mazliet samitrinātu (200 ml ūdens uz 100 kg sēklas materiāla). Pēc tam sajaukt mitrās sēklas ar preparātu tā, lai tās vienmērīgi būtu noklātas ar produktu.
- **Maisījumā ar vircu:** vienu produkta iepakojumu sajaukt ar 800 ml tīra, nehlorēta ūdens, samaisīt ar vienmērīgas konsistences (bez gabaliem) vircu tīrā tvertnē. Iegūto šķidrumu uzliet virsū sēklas materiālam un rūpīgi samaisīt, pārliecinoties, ka sēklas ir noklātas vienmērīgi. Nemaisīt parāk ilgi! Tikai tik, cik nepieciešams vienmērīgai noklāšanai.

HiStick ir jāizlieto drīz pēc iepakojuma atvēršanas.

Neglabāt atvērtu, neizlietu iepakojumu! Ar produktu apstrādātu sēklas materiālu ir jāizsēj dažu stundu laikā pēc to apstrādes. Ieteicams izmantot visu preparātu, pat tad, ja ir jālieto dubultā deva. Nav novērota negatīva ietekme uz augu attīstību.

Uzmanību!

- Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz +25°C.
- Izvairīties no tiešiem saules stariem.
- Nelietot preparātu, ja beidzies tā derīguma termiņš, vai tas ticis uzglabāts neatbilstoši nosacījumiem.
- Uzglabāt inokulantu un apstrādātu sēklas materiālu vēsā, tiešiem saules stariem neaizsniedzamā vietā un pēc iespējas ātrāk izmantot.
- Apstrādātās sēklas pēc iespējas drīz jāizsēj (ieteicams ne vēlāk par dažām stundām pēc apstrādes). Ja tuvākajās 24 stundās tās netiek iesētas, tad apstrāde ar produktu jāveic atkārtoti.
- HiStick nav toksiks un nav bīstams.
- Veicot kodinātu sēklu apstrādi, lietot gumijas cimdus, respiratoru un citus aizsardzības līdzekļus.