

Tanaris®



Pieejams tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma. Lūdzu sazināties ar BASF agronomu!

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos

Reģistrācijas Nr.:	0579
Reģistrācijas klase:	2.
Darbīgās vielas:	dimetēnamīds-P 333 g/l kvinmeraks 167 g/l
Formulācija:	suspo-emulsija
Iepakojums:	5 l

Preparāta apraksts

Dimetēnamīds-P pieder pie hloroacetamīdu klases herbicīdiem, kas sāk darboties, iekļūstot augā. Tas nodrošina augu augšanas kavēšanos, deformāciju un dīgstošo augu bojāeju. Dimetēnamīds-P arī iekļūst augā caur saknēm un dīgstu daļām (hipokotilu, epikotilu). Tādējādi dimetēnamīda-P iedarbība ir ierobežota un ir efektīva nezāļu dīgšanas un

agrās nezāļu attīstības laikā. Dimetēnamīdam-P ir ļoti neliela vai nav iedarbības caur lapām un minimāla mobilitāte. Kvinmeraku augi uzņem gan caur saknēm, gan caur lapām, un tas pārvietojas augā gan akropetāli, gan bazipetāli. Ņemot vērā šo kombinēto iedarbību, Tanaris ir lietojams pirms nezāļu vai tīši pēc nezāļu sadīgšanas.

Efektivitāte, ziemas rapši ar **devu 1,5 l/ha**, apstrādājot pirms rapša sadīgšanas (AS 00–09)

Ļoti augsta efektivitāte (95–100%)

Gerānija, sīkā	Plikstiņš, parastais	Smalkžodzene, parastā
----------------	----------------------	-----------------------

Laba efektivitāte (85–94%)

Kumelīte, tīruma	Kumelīte, ārstniecības	Madara, ķeraīņu
Virza, parastā		

Vidēja efektivitāte (70–84%)

Balanda, baltā	Veronika, persijas
----------------	--------------------

Zema efektivitāte (50–69%)

Magone, zīda	Naudulis, tīruma	Vijolīte, lauka
--------------	------------------	-----------------

Efektivitāte, ziemas rapšī ar **devu 1,5 l/ha**, apstrādājot pēc rapša sadīgšanas (AS 10–18)

Labā efektivitāte (85–94%)

Kumelīte, ārstniecības	Madara, ķeraiņu	Smalkžodzene, parastā
------------------------	-----------------	-----------------------

Vidēja efektivitāte (70–84%)

Kumelīte, tīruma	Virza, parastā	Magone, zīda
------------------	----------------	--------------

Zema efektivitāte (50–69%)

Balanda, baltā	Panātre, sārtā	Gerānija, sīkā
Sinepe, tīruma	Plikstiņš, parastais	

Efektivitāte, vasaras rapšī ar **devu 1,5 l/ha**, apstrādājot pēc rapša sadīgšanas (AS 10–18)

Labā efektivitāte (85–94%)

Madara, neīstā	Madara, ķeraiņu
----------------	-----------------

Vidēja efektivitāte (70–84%)

Kumelīte, tīruma	Panātre, sārtā	Rudzupuķe, parastā
------------------	----------------	--------------------

Zema efektivitāte (50–69%)

Plikstiņš, parastais

Lietošana

! Ievērojiet 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm!

Augu spēja uzņemt Tanaris ir atkarīga no vienmērīgas aktīvo vielu dimetēnamīda-P un kvinmeraka izplatības augsnes ūdens fāzē ap dīgstošajām nezālēm, ko ietekmē augsnes mitrums un augsnes sastrādāšanas kvalitāte. Sausuma apstākļos augsnē Tanaris aktivitāte var būt novilcināta līdz pirmajiem nokrišņiem, tomēr mitruma daudzums augsnē, kāds ir nepieciešams, lai ierosinātu sēklu dīgšanu ir pietiekams, lai aktivizētu herbicīda darbību.

Ziemas rapša sējumos

Deva: 1,5 l/ha. Apstrādi ar Tanaris ziemas rapša sējumos iespējams veikt pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00–09) vai pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18). Lietojot Tanaris pēc kultūrauga sadīgšanas, svarīgi smidzinājumu veikt agrākās nezāļu attīstības stadijās, lai panāktu labāku efektivitāti.

Vasaras rapša sējumos

Deva: 1,5 l/ha. Apstrādi ar Tanaris vasaras rapša sējumos veikt pēc kultūrauga sadīgšanas līdz 8 lapu stadijai (AS 10–18). Labāku herbicīda efektivitāti panākot, to lietojot agrās nezāļu attīstības stadijās.

Ievērbai! Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kas satur dimetēnamidu-P, vairāk kā vienu reizi trijos gados vienā un tajā pašā laukā. Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Nelietot laikā, kad tiek prognozētas spēcīgas lietusgāzes, ja augi cieš no stresa, ir novājināti vai gaidāmas salnas. Nelabvēlīgos laikapstākļos, pēc Tanaris lietošanas augiem iespējamās fitotoksiskuma pazīmes, kas parasti pazūd pēc dažām nedēļām un nerada negatīvu ietekmi uz ražu. Salnu gadījumos var tikt novēroti pārejoši augu apdegumi.

Pēcaugs: pēc ziemas un vasaras rapša novākšanas var tikt audzēti jebkuri kultūraugi. Ja ziemas rapsis, kurš apstrādāts ar Tanaris, rudenī ir gājis bojā, tad tā paša gada rudenī var tikt sēts ziemas rapsis bez augsnes apstrādes, ziemāju graudaugi ar augsnes apstrādi 10 cm dziļumā. Ja ziemas rapsis, kas apstrādāts ar Tanaris, rudenī ir gājis bojā, tad pavasarī var tikt sēti – burkāni, graudaugi, kāposti, vasaras rapsis, kukurūza, sīpoli, zirņi un lauka pupas – bez augsnes apstrādes, bet ar augsnes apstrādi 10 cm dziļumā – salāti un daudzgadīgā aīrene. Ja vasaras rapsis ir gājis bojā, tad bez augsnes apstrādes var tikt sēti – vasaras rapsis, kāposti, sīpoli, kukurūza, zirņi un lauka pupas, bet veicot augsnes apstrādi 10 cm dziļumā arī graudaugi.

Tvertnes maisījumi: Tanaris var lietot tvertnes maisījumos kopā ar Focus Ultra + Dash, Teridox, Ikarus, Caramba un Caryx. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar kompāniju pārstāvjiem.

Ieteicamais darba šķīduma daudzums: 100–400 l/ha.

Uzmanību!

H317, H319, H410, EUH401, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P333+P313, P337+P313, P391, P501, SP1, SPe1, P, SPe3¹, SPe3^{2*}