



DSG

DE SANGOSSE GROUP

**Ziemāju sējas sezona tuvojas –
sagatavojieties kailgliemežu ierobežošanai!**



Liela kailgliemežu populācija miera stadijā



**Nenovērtējiet par zemu kailgliemežu radīto bojājumu risku
2026.–2027. gada ziemāju sējumos.**

Sausuma periodos kailgliemeži ieslīgst miera stāvoklī un paslēpjas augsnē. Palielinoties mitrumam, tie strauji aktivizējas, iznāk virspusē un sāk intensīvi baroties.

Patlaban neaktīvo kailgliemežu populācija veidojusies vairāku gadu laikā,
un tās pieaugumu veicinājuši:



2023.–2025. gads –
kailgliemežiem īpaši
labvēlīgi apstākļi

+

2026. gada
vasaras sākums –
pārmaiņus silti
un mitri laikapstākļi

Kailgliemeži spēj pārciest nelabvēlīgus apstākļus, paslēpjoties augsnes plaisās,
zem augsnes cilām, akmeņiem, augu atliekām vai mulčas, kā arī lauku malās.

Tie joprojām ir klātesoši, turklāt lielā skaitā, pat ja tos neredzat!

Kailgliemežu ierobežošanas stratēģija


- **Izvērtējiet lauka riska faktorus:** kailgliemežu izplatība iepriekšējos gados, izmantotās augsnes apstrādes metodes un laikapstākļus.
- **Veiciet kailgliemežu monitoringu,** izmantojot uzskaites paklājus vai citus slazdus: nosakiet sugas, to sastopamību, aktivitāti un populācijas blīvumu.
- **Nosakiet piemērotāko apstrādes laiku,** ņemot vērā kailgliemežu sastopamību un aktivitāti, kaitīguma sliekšni, agrotehniskos pasākumus, laikapstākļus un kultūrauga attīstības stadiju.
- **Devu pielāgojiet kailgliemežu populācijas blīvumam** – zemam, vidējam vai augstam.
- **Nodrošiniet vienmērīgu ēsmas granulu izkliedi,** izmantojot piemērotu, tehniskā kārtībā esošu un pareizi noregulētu izklienētāju.
- **Pārbaudiet ēsmas granulu pieejamību uz augsnes** – vai tās nav apēstas vai noārdījušās un vai nepieciešama atkārtota apstrāde.
- **Izmantojiet arī citus kailgliemežu ierobežošanas paņēmienus:** augsnes apstrādi, agrotehniskos pasākumus un derīgos organismus.

Kailgliemežu ierobežošanas stratēģija: piemērotākais apstrādes laiks

Turpiniet kailgliemežu monitoringu:

- novērtējiet to sastopamību, aktivitāti un populācijas blīvumu
- pārbaudiet ēsmas granulu pieejamību – vai tās nav apēstas vai noārdījušās

Ja **ziemas rapša laukā konstatēts vismaz 1 kailgliemezis/m²**, bet **ziemas kviešu laukā – vismaz 5 kailgliemeži/m²**, lauku vēl var pievelt un/vai lietot moluskicīdu Ironmax® Pro.



Veiciet kailgliemežu monitoringu. Ja **ziemas rapša laukā konstatēti vismaz 5 kailgliemeži/m²**, bet **ziemas kviešu laukā – vismaz 10 kailgliemeži/m²**, lietojiet moluskicīdu Ironmax® Pro.

Atsāciet kailgliemežu monitoringu 1–2 reizes nedēļā. Lietojiet moluskicīdu Ironmax® Pro, ja **ziemas rapša laukā konstatēti vismaz 5 kailgliemeži/m²**, bet **ziemas kviešu laukā – vismaz 10 kailgliemeži/m²**.

Riska faktori:

- salmu klātbūtne
- augu atliekas vai starpkultūra
- cilaina augsne
- nepietiekami noslēgta sējas gultne
- izlīdzināta sējas gultnes pamatne kas veicina kailgliemežu pārvietošanos

* **Vispiemērotākais periods kailgliemežu radīto bojājumu riska mazināšanai.**

Ja konstatēti šie riska faktori, pēc sējas var būt nepieciešama lokāla moluskicīda Ironmax® Pro lietošana atsevišķās sējuma vietās.

Ironmax® Pro – ar datiem pierādīts efektivitātes līderis cīņā ar kailgliemežiem!

