



Corum[®]

Herbicīds




Corum[®] ir selektīvs sistēmas un pieskares iedarbības herbicīds, ko lieto zirņu, lauka pupu un dārza pupiņu sējumos pēc nezāļu sadīgšanas.

Darbīgās vielas:	imazamoks 22,4 g/l
	bentazons 480 g/l
Lietošanas deva:	Corum [®] 1,25 l/ha + Dash [®] 0,5-1,0 l/ha

PRIEKŠROCĪBAS:

- Augsta efektivitāte
- Plašs divdīgļlapju nezāļu spektrs
- Elastīga lietošana



**PIEMĒROTS ARĪ MINIMĀLĀS AUGSNES
APSTRĀDES TEHNOLOĢIJĀS**

■ - BASF

We create chemistry

CORUM® EFEKTIVĀTE:

Corum® satur **divas darbīgās vielas** – imazamoks 22,4 g/l un bentazons 480 g/l. Šo divu darbīgo vielu kombinācija **nodrošina augstu efektivitāti pret plašu divdīgļlapju nezāļu spektru. Corum® ir īpaši efektīvs pret krustziežu dzimtas nezālēm.**

Nezāļu suga	Efektivitāte	Nezāļu suga	Efektivitāte
plikstiņš, ganu	xxxx	gerānijas	xxx
panātre, sārtā	xxxx	akļi	xxx
virza, parastā	xxxx	veronika, tīrumu	xxx
naudulis, tīruma	xxxx	madara, ķeraiņu	xxx
veronika, persijas	xxxx	kumelīte, tīruma	xxx
zvēre, tīruma	xxxx	balanda, baltā	xxx
pērkone, tīruma	xxxx	vējgrīķis, dārza	xxx
amarants, atliktais	xxxx	sūrene, blusu	xxx
naktene, melnā	xxxx	vijolīte, tīruma	xx
mīkstpiene, tīruma	xxx	rudzupuķe, zilā	xx

Efektivitāte: xxxx – ļoti augsta | xxx – augsta | xx – vidēja

KĀ NODROŠINĀT VISAUGSTĀKO CORUM® EFEKTIVITĀTI:

- Vislabākos rezultātus sasniegsiet, ja nezāles apstrādes brīdī būs mazas, dīgļlapu-pirmo īsto lapu stadijā, tāpēc labākā rezultāta sasniegšanai vienmēr pievērsiet uzmanību nezāļu attīstības stadijai. **Īpaši svarīgi tas ir, lai sekmīgi ierobežotu balto balandu.**
- Maksimālai efektivitātei nepieciešams arī silts laiks, vēlams virs +10-12 °C.
- Un atcerieties vienmēr pievienot virsmas aktīvo vielu Dash®!

CORUM® LIETOŠANA:

Lietošanas deva: Corum® 1,25 l/ha + Dash® 0,5-1,0 l/ha.

- Corum® var lietot ziņos un lauka pupās sākot no divu īsto lapu attīstības stadijas līdz deviņu lapu attīstības stadijai (AS 12-19), dārza pupiņās sākot no divu īsto lapu attīstības stadijas līdz piecu sāndzinumu attīstības stadijai (AS 12-25).
- **Var lietot arī dalīti – 2 reizes Corum® ar devu 0,625 l/ha + Dash® 0,5 l/ha**, starp apstrādēm ievērojot 7-14 dienu intervālu. Pirmo apstrādi veikt sākot no divu līdz četru īsto lapu attīstības stadijas (AS 12-14) un otro apstrādi sākot no sešu īsto lapu attīstības stadijas līdz deviņu lapu attīstības stadijai zirņos, lauka pupās (AS 16-19) un dārza pupiņās, sākot no sešu īsto lapu attīstības stadijas līdz piecu sāndzinumu attīstības stadijai (AS 16-25).




Gadījumā, ja iepriekš ir lietots Stomp®, iespējams nogaidīt līdz jaunu nezāļu sadīgšanai un lietot Corum® 1,0 l/ha + Dash 0,5-1,0 l/ha.

Neveidot tvertnes maisījumus ar graminičīdiem un insekticīdiem!

BASF Agricultural Solutions | Latvija

+371 67 893 559, e-pasts: agronom@basf.com, www.agro.basf.lv

 BASFAgriculturalSolutionsLV

 **BASF**

We create chemistry