

Stomp[®] CS

Herbicīds

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, āboliņa, kukurūzas, zirņu, lauka pupu, dārza pupiņu, dārza pupu, sojas pupu, stiebrzāļu (sēklai), puravu, burkānu, sakņu pētersīļu, lapu pētersīļu, dilļu, maurloku, pastinaku, sakņu selerijas sējumos, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos ar āboliņa, lucernas vai stiebrzāļu pasēju, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos maisījumā ar zirņiem, sīpolu, ķiploku, kāpostu, kartupeļu, krūmelleņu, tulpju un narcīšu stādījumos, kā arī stādaudzētavās, golfa laukumos un īscirtmeta atvasāju plantācijās (kārkli, papeles).

Darbīgā viela: pendimetalīns 455 g/l

Preparatīvā forma: mikrokapsulu suspensija (CS)

Reģistrācijas Nr. 0431 Reģistrācijas klase: 2.



Uzmanību

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH204 Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P308 +P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību

P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro noteikta aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Aizsargjoslas platumu skatīt lietošanas instrukcijā.

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: pendimetalīns

Signature not validated



Digitally signed by LAURA ŽIDELE

Date: 2026.04.29 08:41:49 EEST

Emergency information telephone: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

Uzglabāšana: Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš, glabājot neatvērtu, oriģinālā iepakojumā - 3 gadi no izgatavošanas datuma.

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Neto: 10 L (1 L; 5 L)

Ražotājs, Reģistrācijas apliecības īpašnieks: BASF SIA, Lambertu iela 33 B, Mārupe, tālr. 67 508 250

® - BASF reģistrēta tirdzniecības zīme

Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties, turot atvērtas, skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un izdzert 200-300 ml ūdeni, meklēt medicīnisko palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Veikt simptomātisku ārstēšanu specifisks antidots nav zināms. **Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67 042 473**

Drošības prasības un personāla drošība.

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi cimdī EN 374 un slēgti apavi, nepietiekamas ventilācijas apstākļos lietot P2 vai FFP2 tipa respiratoru ar daļiņu filtru EN 143 vai 149. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Darba apģērbu neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidrums pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Stomp® CS

Herbicīds

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša, ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, āboliņa, kukurūzas, zirņu, lauka pupu, dārza pupiņu, dārza pupu, sojas pupu, stiebrzāļu (sēklai), puravu, burkānu, sakņu pētersīļu, lapu pētersīļu, dilļu, maurloku, pastinaku, sakņu selerijas sējumos, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos ar āboliņa, lucernas vai stiebrzāļu pasēju, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos maisījumā ar zirņiem, sīpolu, ķiploku, kāpostu, kartupeļu, krūmelleņu, tulpju un narcišu stādījumos, kā arī stādaudzētavās, golfa laukumos un īscirtmeta atvasāju plantācijās (kārkli, papeles).

Darbīgā viela: pendimetalīns 455 g/l
Reģistrācijas Nr. 0431

Preparatīvā forma: Mikrokapsulu suspensija (CS)
Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts

Stomp CS darbīgā viela ir ieslēgta mikrokapsulās. Pēc smidzināšanas mikrokapsulas pakāpeniski atbrīvo tajā esošo pendimetalīnu un līdz ar to nodrošina ilgstošu un efektīvu nezāļu kontroli. Stomp CS ir piemērots minimālajai augsnes apstrādes tehnoloģijai, jo, pateicoties mikrokapsulām, nepielīp pie augu atliekām un nonāk uz augsnes.

Stomp CS ir plaša spektra herbicīds, kurš iedarbojas uz nezālēm caur augsni, iekļūstot sakņu sistēmā, kā arī caur lapām, ja lietots pēc sadīgšanas. Preparāts turpina darboties augsnē vairākas nedēļas. Vislabāko efektivitāti var sasniegt, ja smidzināšanas laikā ir pietiekams augsnes mitrums un nezāles ir dīgļlapu vai pirmo īsto lapu stadijā. Stomp CS ir selektīvs ļoti daudziem laukaugiem un dārzeņu kultūrām.

Stomp CS ir efektīvs pret šādām nezālēm:

Nezāles	0.44 l/ha	0.73 l/ha	0.88 l/ha	1.6 l/ha	1.8 l/ha	2.6 l/ha pirms sadīgšanas	2.6 l/ha pēc sadīgšanas
Ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria chamomilla</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XX	n.d.
Blusu sūrene (<i>Polygonum persicaria</i>)	n.d.	XX	XXX	XX	n.d.	XXX	X
Baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	n.d.	XX	XX	XX	XX	XXX	XX
Dārza vējgrīķis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	n.d.	X	X	n.d.	X	XX	X
Ganu plikstiņš (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	X	X	n.d.	X	n.d.	XXX	X
Īsstaru sīkgaļvīte (<i>Galinsoga parviflora</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XX	X
Kodīgā nātre (<i>Urtica urens</i>)	n.d.	XXX	n.d.	XXX	n.d.	n.d.	n.d.
Ķeraiņu madara (<i>Galium aparine</i>)	n.d.	X	XXX	n.d.	n.d.	XX	XXX
Lauka ilzīte (<i>Anthemis arvensis</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXX	n.d.
Lauka veronika (<i>Veronica agrestis</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXXX	n.d.
Liektais amarants (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXX	n.d.
Maura sūrene (<i>Polygonum aviculare</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXXX	n.d.
Melnā naktene (<i>Solanum nigrum</i>)	n.d.	X	n.d.	X	n.d.	XXXX	n.d.
Mezglainā sūrene (<i>Persicaria lapathifolia</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XX	n.d.
Nakts plaukšķene (<i>Silene noctiflora</i>)	XXXX	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Parastā gaiļsāre (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXX	X
Parastā virza (<i>Stellaria media</i>)	X	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXXX	XXXX
Persijas veronika (<i>Veronica persica</i>)	XXX	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXXX	n.d.
Sārtā panētre (<i>Lamium purpureum</i>)	n.d.	XXX	XXX	n.d.	n.d.	XXXX	XXXX
Sīkā gandrene (<i>Geranium pusillum</i>)	n.d.	X	n.d.	XX	n.d.	n.d.	n.d.
Šķeltā gandrene (<i>Geranium dissectum</i>)	n.d.	X	n.d.	XX	n.d.	n.d.	n.d.

Tiruma aitene (<i>Anchusa arvensis</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXXX	n.d.
Tiruma atraitnīte (<i>Viola arvensis</i>)	n.d.	X	n.d.	XX	n.d.	XXX	n.d.
Tiruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XXX	n.d.
Tiruma naudulis (<i>Thlaspi arvense</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	XX	n.d.	XXX	XXX
Tiruma sinepe (<i>Sinapis arvensis</i>)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	XX	n.d.
Tiruma veronika (<i>Veronica arvensis</i>)	n.d.	XXX	XXX	n.d.	n.d.	XXXX	n.d.
Zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>)	XXX	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

XXXX iedarbība 95 – 100%,

XXX iedarbība 85 – 94,9%,

XX iedarbība 70 – 84,9%,

X iedarbība 50 - 69.9%.

n.d. - nav datu

Lietošanas ieteikumi:

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ziemas rapsis	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.44		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-09)	-	1
Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, ziemas rudzi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz divu lapu stadijai (AS 10-12)	-	1
Āboliņš	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.0		Apsmidzināt sējumus, kad āboliņš ir 1-3 lapu stadijā (AS 11-13)	42	1
Kukurūza	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20-2.60		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 5 cm) pirms kultūrauga sadīgšanas līdz kultūrauga 3 lapu stadijai (AS 00-13)	90	1
Vasaras kvieši, vasaras mieži ar āboliņa, lucernas vai stiebrzāļu pasēju	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.9		<u>1.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz kultūrauga sadīgšanai (AS 00-09)	42	1
		1.0		<u>2.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz tā 1-3 lapu stadijai (AS 10-13), kad āboliņš, lucerna vai stiebrzāle ir 1-2 lapu stadijā	42	
Vasaras kvieši, vasaras mieži maisījumā ar zirņiem	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.9		<u>1.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)	42	1

		1.0		<u>2.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz kultūrauga 1-3 lapu stadijai (AS 10-13)	42	
Stiebrzāles (sēklai) *	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	0.5		Apsmidzināt sējumus, pēc nopļaušanas. Atkārtoti pēc 14 dienām	-	2
Zirņi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20-2.60		<u>1.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)	42	1
		1.10-2.20		<u>2.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz kultūrauga trīs lapu stadijai (AS 10-13)	42	
Lauka pupas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20-2.60		<u>1.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)	42	1
		1.10-1.45		<u>2.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz kultūrauga trīs lapu stadijai (AS 10-13)	42	
Dārza pupiņas, dārza pupas	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20-2.60		<u>1.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)	42	1
		1.10-1.45		<u>2.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz kultūrauga trīs lapu stadijai (AS 10-13)	42	
Sojas pupas *	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.5		Apsmidzināt sējumus pēc sējas pirms kultūrauga un nezāļu sadīgšanas (AS 00-09)	42	1
Sīpoli, ķiploki	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6		<u>1.variants - sējot</u> Apsmidzināt kultūraugus (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pēc sējas līdz četrām lapām (AS 00-14)	56	1
		2.20-2.60		<u>2.variants - stādot</u> Apsmidzināt kultūraugus (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pēc stādīšanas līdz pirmā lapa attīstījusies 3 cm (AS 00-11)	56	

Puravi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		<u>1.variants – sējot</u> Apsmidzināt kultūraugus (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pēc stādīšanas līdz to sadīgšanai (AS 00-09)	56	1
		2.20- 2.60		<u>2.variants – stādot</u> Apsmidzināt kultūraugus (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pēc stādīšanas līdz to sadīgšanai (AS 00-09)	56	
Burkāni, sakņu pētersīļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		Apsmidzināt sējumus pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) pirms kultūrauga sadīgšanas (AS 00-09)	90	1
Dilles	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz tā sadīgšanai (AS 00-09)	49	1
Maurloki	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz tā četru lapu stadijai (AS 00-14)	56	1
Pastinaki*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm), pirms kultūrauga sadīgšanas	-	1
Selerijas (sakņu) *	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		Apsmidzināt sējumu vai stādījumu pēc kultūrauga sadīgšanas vai izstādīšanas tā 2-3 lapu stadijā	-	1
Pētersīļi (lapu) *	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		Apsmidzināt stādījumu, kultūrauga 2-3 lapu stadijā	-	1
Kāposti	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		<u>1.variants</u> Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz tā sadīgšanai (AS 00-09)	-	1
		2.20- 2.60		<u>2.variants</u> Apsmidzināt augsni pirms kultūrauga izstādīšanas.	-	
Kartupeļi	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		Apsmidzināt kultūraugus pēc stādīšanas līdz to sadīgšanai (AS 00-09)	45	1
Krūmmellenes*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20- 2.60		Apsmidzināt stādījumu pirms kultūrauga ziedēšanas vai pēc ražas novākšanas. Nezāles līdz 2 lapu stadijai	-	1

Tulpes, narcises	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.6		Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas (AS 00-13)	-	1
Stādaudzētavā	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	1.6		Apsmidzināt pirms ziemas iestāšanās pirms nezāļu sadīgšanas	-	1
Golfa laukums*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.20-2.60		Apsmidzināt laukumu pavasarī atjaunoties veģetācijai, ja nepieciešams atkārtoti. Kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4.35 l/ha	-	2
Īscirtmeta atvasāju plantācijas (kārkli, papeles)*	Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles	2.18-2.60		Apsmidzināt stādījumus pēc to ierīkošanas, pirms nezāļu dīgšanas	-	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Lietošana tvertnes maisījumā ar Basagran 480

Lai nodrošinātu papildu efektu pret tādām bieži sastopamām divdīgļlapju nezālēm kā kumelītes, ķeraiņu madara, vijolītes, panātres, akļi, ārstniecības matuzāle, maura sūrene, veronikas, parastā virza, baltā balanda, tīruma zvēre u.c., **zirņu un pupu sējumos, kā arī vasaras kviešu vai vasaras miežu sējumos ar āboliņa vai lucernas pasēju, kā arī šo graudaugu maisījumos ar zirņiem**, ieteicams lietot **Stomp® CS** tvertnes maisījumā ar **Basagran® 480**, devā **1,0–2,0 l/ha**. Šāds maisījums nodrošina uzlabotu agrīno nezāļu ierobežošanu, īpaši, ja smidzinājums veikts laikā no nezāļu sadīgšanas līdz 2 īsto lapu stadijai, kad preparāti uzrāda visaugstāko efektivitāti.

Piezīme.

Lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro noteikta aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Aizsargjoslas platumu skatīt tabulā “Aizsargjoslas platums līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm”. Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Aizsargjoslas platums līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Kultūraugs	Deva, l/ha	Standarta sprauslas	Sprauslas ar 50% smidzinājuma noneses samazinājumu	Sprauslas ar 75% smidzinājuma noneses samazinājumu	Sprauslas ar 90% smidzinājuma noneses samazinājumu
Kultūraugu sējumi un stādījumi	0.44 -1.1	10 m	10 m	10 m	10 m
	1.45 – 2.6	25 m	25 m	10 m	10 m

Ūdens patēriņš: 100-400 l/ha.

Nav novērota nekāda pēcietekme pēc Stomp CS, ja tiek ievēroti lietošanas noteikumi.

Pēckultūras

Pēc kultūrauga, kas apstrādāts ar Stomp CS, novākšanas var sēt jebkurus augus, ja tiek ievērota pareiza augu maiņa. Pēc īsās sezonas augiem, kā piemēram dārzeniem, nepieciešams veikt augsnes apstrādi 15-25 cm dziļumā.

Ja ar Stomp CS apstrādātie sējumi kaut kādu iemeslu dēļ gājuši bojā:

Rudenī apstrādātie kultūraugi ir aizgājuši bojā, tad pavasarī pirms sējas ir jāveic augsnes apstrāde 15-25 cm dziļumā un var sēt vasaras kviešus, vasaras miežus, auzas, vasaras rapsi, cukurbietes, zirņus un kukurūzu.

Pieredze citās valstīs rāda, ka ārkārtējos gadījumos var arī sēt/stādīt kartupeļus, lauku pupas, lucernu, soju, saulespuķes, linus, kāpostus, puķkāpostus, burkānus, pastinakus un pētersīļus.

Ja ar Stomp CS apstrādātie sējumi ir gājuši bojā pavasarī, tad var veikt atkārtotus sēšanas darbus. Bez augsnes apstrādes, veicot tiešo sēju, minimums 3-5 cm dziļumā, var sēt kukurūzu, lauka pupas, zirņus, lupīnu, soju un saulespuķes. Veicot augsnes apstrādi 15-25 cm dziļumā un nogaidot vismaz 2-8 nedēļas, var sēt kultūraugus, kas minēti uz Stomp CS marķējuma kā apstrādājamie kultūraugi.

Rezistences riska ierobežošana:

Pastāv risks, ka nezāļu biotipiem var veidoties rezistence pret dažādu herbicīdu darbīgajām vielām.

Stomp CS pieder darbīgo vielu grupai dinitroanilīni (HRAC grupa 3(K1)), kas tiek uzskatīta par tādu, kurai ir zems rezistences attīstības risks. Eiropā ir ziņots par rezistenci tikai uz parasto gaiļsāri (*Echinochloa crus-galli*) un peļastīšu lapsasti (*Alopecurus myosuroides*) ziemeļu zonas valstīs.

Lietojot produktus ar līdzīgu darbīgo vielu iedarbību, var palielināt rezistences risku. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, ieteicams veidot maisījumus ar citiem produktiem, kuriem ir atšķirīgs iedarbības mehānisms un laba efektivitāte nezāļu ierobežošanā.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Stomp CS var jaukt kopā ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem. Neskaidrību gadījumā kontaktēties ar uzņēmuma BASF pārstāvjiem Latvijā.

Darba šķidruma sagatavošana

Pirms lietošanas jāpārbauda vai smidzinātājs ir darba kārtībā un nokalibrēts pēc normatīvo aktu prasībām.

Pirms lietošanas vienmēr pārbaudīt smidzinātāju un pārlicināties par tā tīrību.

Piepildīt ½ - ¾ smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēgt maisītāju. Ieliet nepieciešamo produkta/ produktu daudzumu. Izskalot tukšo iepakojuma kannu. Skalojamo ūdeni ieliet smidzinātāja tvertnē. Iepildīt tvertnē atlikušo ūdens daudzumu. Turpināt maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Darba šķidrums ir jāizlieto uzreiz pēc tā sagatavošanas.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana vienmēr jāveic tā, lai izvairītos no darba šķidruma nonesēm ar vēju uz blakus esošām platībām vai smidzinātāja gājienu pārklāšanās. Apstrādes laikā vēja ātrums nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas (< 4 m/s). Sprauslu izvēle jāpieskaņo laika apstākļiem un situācijai kopumā. Vienmērīga kultūraugu pārklāšana ar darba šķidrumu ir priekšnoteikums labai produktu efektivitātes nodrošināšanai.

Smidzinātāja tīrīšana

Kārtīgi izmazgāt smidzinātāju tūlīt pēc lietošanas vai mainot augu aizsardzības līdzekli.

1. Iepildiet 1/3 daļu ūdens smidzinātāja tvertnē. Skalojiet smidzinātāja tvertni, ieslēdzot tā iekšējās cirkulācijas sistēmu. Izsmidziniet uz lauka. Atkārtojiet procesu trīs reizes. Katrā nākošajā skalošanas reizē pievienojiet svaigu ūdeni vismaz 10% apmērā no tvertnes ietilpības. Smidzinātāju pilnībā var iztukšot uz bioloģiski aktīvas augsnes vai arī speciāli tam paredzētā tvertnē.

2. Notīriet traktora un smidzinātāja ārpusi pēc darba, ieteicams uz tīruma.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro noteikta aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Aizsargjoslas platumu skatīt tabulā "Aizsargjoslas platums līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm". Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Iepakojuma likvidēšana

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 3 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai un reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamās izmaiņas preparāta iedarbībā vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties mūsu ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.