

Vasaras rapsis

2026

Augu aizsardzības shēma konvencionālajai audzēšanas tehnoloģijai

Fungicīdi

* iesakam lietot sējumos, kuros augsts ražas potenciāls
** pie augsta slimību riska lietot lielāko ieteikto devu

Caryx® 0,7 l/ha*

Architect® 1,0 – 2,0 l/ha

Revydas® 0,6 – 1,0 l/ha**

Pictor® Active 0,6 – 1,0 l/ha**




Herbicīdi

Butisan® Avant 2,0 – 2,5 l/ha

Butisan® Star 2,0 – 2,25 l/ha

Limacīds

Ironmax® Pro 7 kg/ha



Butisan® Avant

Darbigās vielas: dimetēnamīds-P 100 g/l
kvinmeraks 100 g/l
metazahloris 300 g/l

Iedarbība: caur saknēm un dīgstiem

- pirmais rapša herbicīds ar trīs darbīgām vielām
- saudzīgs kultūraugam
- elastīgs apstrādes laiks (tūlīt pēc sējas līdz nezāļu dīgļlapu stadijai)
- saglabā iedarbību vairākus mēnešus
- plašs iedarbības spektrs uz divdīgļlapju un tismūža viendīgļlapju nezālēm
- paplašināts ierobežojamo nezāļu spektrs t.sk.: gandrenes, ķeraiņu madaras, žodzenes, magones
- uzlabota efektivitāte per krustziežu dzimtas nezālēm
- var veidot tvertnes maisījumu ar Focus® Ultra nepievienojot Dash®, ja sakrīt apstrādes laiki
- herbicīda efektivitāte mazāk atkarīga no augsnes mitruma un augsnes tipa
- nav ierobežojumi nākamā gada kultūraugu izvēlei

Butisan® Star

Darbigās vielas: metazahloris 333 g/l
kvinmeraks 83 g/l

Iedarbība: caur saknēm un dīgstiem

- saudzīgs kultūraugam
- elastīgs apstrādes laiks uz lauka (tūlīt pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai)
- saglabā iedarbību vairākus mēnešus
- plašs iedarbības spektrs uz divdīgļlapju un tismūža viendīgļlapju nezālēm
- īpaši piemērots ar **ķeraiņu madaru, kumelīti un zīda magoni** piesārņotos laukos
- var veidot tvertnes maisījumu ar Focus® Ultra, nepievienojot Dash®, ja sakrīt apstrādes laiki
- optimāls augsnes mitrums veicina herbicīda efektivitāti
- nav ierobežojumi nākamā gada kultūraugu izvēlei

Caryx®

Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds 210 g/l
metkonazols 30 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

Pavasari:

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos – vairāk sānzari un pākstis
- agrīna sausplankumainības un sausās puves kontrole
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana
- augstākam rezultātam optimāls apstrādes laiks, kad augs sasniedzis 25 cm garumu

Architect®

Darbīgā viela: piraklostrobīns 100 g/l
kalcijs proheksadions 25 g/l
mepikvāta hlorīds 150 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbības fungicīds un augu augšanas regulators

Pavasari:

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos – vairāk sānzari un pākstis
- ierobežo sausās puves un krustziežu gaišplankumainības izplatību
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana

Pictor Active®

Darbīgā viela: boskalīds 150 g/l
piraklostrobīns 250 g/l

Iedarbība: translamināra un sistēmas

- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- palielina 1000 sēklu svaru un ražu
- samazināts pākšu atvēršanās risks
- veicina augu stresa noturību
- pozitīvs fizioloģiskais efekts – vienmērīga ziedēšana un nogatavošanās
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL un lapu mēslojumiem

Revydas®

Darbīgā viela: mefentriflukonazols (Revsol) 100 g/l
boskalīds 200 g/l

Iedarbība: translamināra ar aizsargājošu efektu

- pirmais fungicīds rapsī, kas satur darbīgo vielu Revsol®
- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- ilgāks apstrādes periods un ilgstoša iedarbība
- izcila lietus noturība
- nodrošina augstāku ražu iegūšanu
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL

Ironmax® Pro


Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts 24,2 g/kg

Iedarbība: ēsmas granulas

Ierobežojamie organismi: kailgliemeži un mīkstgliemeži

- lieliska izkliedējamība
- ēsmas pievilkina gliemežus
- teicama lietus noturība
- nav kaitīgs sliekām!

Rapša attīstības stadijas pēc BBCH skalas



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:

 zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:
palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā būtisks ražas pieaugums

AAL augu aizsardzības līdzekļi

AS augu attīstības stadija

VAV virsmas aktīvā viela

 fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts

 īpaši augsta lietus noturība

 aptver visu slimību spektru