

Fungicīdi

Balaya® 1,0 l/ha
Priaxor® 0,75 – 1,0 l/ha




Augšanas regulatori

Terpal® 0,5 – 1,5 l/ha
Medax® Max 0,3 kg/ha

Systiva® 0,75 l/t – fungicīds sēklas materiāla kodināšanai!

Kinto® Plus 1,5 l/t



Priaxor® 

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds 75 g/l
piraklostrobīns 150 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu efektu

- ierobežo nozīmīgākās graudaugu slimības
- pozitīvi ietekmē fizioloģiskos procesus augā
- nodrošina ilgstošu aizsardzību pret slimībām
- elastīgs lietošanas laiks

Balaya® 

Darbīgās vielas: mefentriflukonazols
(Revysol) 100 g/l
piraklostrobīns 100 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbība ar aizsargājošu un ārstējošu efektu

- izcili ierobežo nozīmīgākās graudaugu lapu slimības
- ļoti augsta efektivitāte pret kviešu lapu pelēkplankumainību
- ātri iekļūst augā un nogrošina ilgstošu graudaugu lapu aizsardzību
- pozitīvi ietekmē fizioloģiskos procesus augā
- elastīgs lietošanas laiks

Fungicīdi

Viena apstrāde

Terpal®

Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds 305 g/l
eteofons 155 g/l

Iedarbība: sistēmas caur lapām

- palielina stiebra diametru
- saīsina stiebru
- samazina miežu vārpu lūšanu
- lietojot kopā ar BASF fungīdiem, regulatora devu var samazināt par 25%, bet ne zemāku devu kā 0,5 l/ha
- var lietot stiebrzāļu un tauriņziežu pasējās

Medax® Max

Darbīgās vielas: kalcijs proheksadions 50 g/kg
etil-trineksapaks 75 g/kg

Iedarbība: sistēmas caur lapām un stiebrēm

- palielina stiebra diametru, samazina stiebra garumu
- ātra sākuma iedarība ar ilgstošu ietekmi
- nostiprina sakņu sistēmu, veicina sakņu sistēmas apjoma pieaugumu
- saīsina stiebra augšējo starpmezglu posmu garumu
- samazina veldres risku

Augu augšanas regulatoru pielietošana nodrošina:

- ātrāku ražas novākšanas tempu
- zemākus kaltēšanas izdevumus

Kinto® Plus

Darbīgās vielas: tritikonazols 33,3 g/l
fluksapiroksāds 33,3 g/l
fludioksonils 33,3 g/l

Iedarbība: sistēmas un pieskares

- lietojams visos vasarāju un ziemāju graudaugos
- ierobežo slimību ierosinātājus, kuri atrodas sēklā, uz sēklas un augsnē
- augsta efektivitāte un plašs ierobežojamo slimību spektrs:
 - augsta efektivitāte pret sakņu puvi un visu veidu melnplaukām
 - augsta efektivitāte pret sniega pelējumu
- neaizkavē kultūraugu dzīvību
- izteikts pigments un vienmērīga graudu pārklāšana
- labas birstamības īpašības kodinātajām sēklām
- kodinātās sēklas neput
- pozitīvi ietekmē sakņu sistēmas attīstību

Systiva®

Darbīgās vielas: fluksapiroksāds 333 g/l

Fungicīds sēklas materiāla kodināšanai

- pirmā sēklu kodne, kas darbojas arī kā fungicīds pret vairākām lapu slimībām
- iedarbība ilgst līdz dažiem mēnešiem, var aizvietot agri apstrādi ar fungicīdu
- augsta efektivitāte pret miežu lapu tīklplankumainību un citām nozīmīgām slimībām
- lai ierobežotu melnplaukas, lietot tvertnes maisījumā ar efektīvu kodni

Augu
augšanas
regulatori



Kodnes



Graudaugu attīstības stadijas pēc BBCH skalas

00 - 10 dīgšana

- 00 sausi graudi
- 05 parādās dīglsakne

10 - 19 dīgstu augšana

- 10 pirmā lapa, koleoptile virs zemes
- 13 trīs lapas

20 - 29 cerošana

- 21 pirmie sāndzinumi
- 25 pieci sāndzinumi
- 29 deviņi vai vairāk sāndzinumi

30 - 39 stiebrošana

- 30 stiebrs sāk stiepties garumā
- 31 pirmais mezgls
- 32 divi mezgli
- 37 karoglapas parādīšanās
- 39 karoglapas austiņas parādīšanās

40 - 49 vārpa piebriešana karoglapas makstī


- 49 redzami akotu gali

51 - 59 vārpošana

- 51 pirmās vārpiņas parādīšanās
- 59 vārpošanas beigas, redzama visa vārpa

61 - 69 ziedēšana

71 - 92 graudu veidošanās un nogatavošanās



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:



zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:
palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot
mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā
būtisks ražas pieaugums



fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts



īpaši augsta lietus noturība



aptver visu slimību spektru

AAL augu aizsardzības līdzekļi

AS augu attīstības stadija

VAV vīrsmas aktīvā viela