


Fungicīdi

Revyona® 0,75–1,25 l/ha



Herbicīdi

Stomp® CS 2,18–4,35 l/ha



Stomp® CS

Darbīgā viela: pendimetālins 455 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbība, caur augsni un dzīstiem

- efektīvs pret īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm, lietojot optimālos augsnes mitruma apstākļos
- augsta efektivitāte pret viendīgļlapjiem: rudzusmilgu, maura skareni
- īpaši piemērots, ja galvenā problēma ir tīrums vijolīte
- augsta efektivitāte pret plašu divdīgļlapju nezāļu spektru (variē no lietotās devas)

Herbicīdi

Revyona®

Darbīgā viela: mefentriflukonazols (Revysol) 75 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

- efektīvs pret kukurūzas lapu un acsveida plankumainību, rūsu un fuzariozi
- elastīgs lietošanas laiks
- izcila lietus noturība

Fungicīdi

Kukurūzas attīstības stadijas atbilstoši decimālajam kodam (Lancashire et al., 1991)

1. dīgšana

- 00 sausas sēklas
- 05 parādījušies dīgļsakne

2. lapu attīstība

- 11 atritinājušies pirmā ovālā lapa*
- 13 – 19 atritinājušās 3 – 9 (vai vairāk)** lapas

3. stiebrošana

- 30 sākas stiebra stiepšanās garumā
- 31 redzams viens mezgls
- 32 – 39 redzami 2 – 9 (vai vairāk)*** mezgli

5. ziedkopas parādīšanās – skarošana

- 51 skarošanas sākums: skara stiebra augšgalā sataustāma
- 53 parādījušies skaras galotne
- 59 skara pilnībā redzama, zari sadalījušies

6. ziedēšana

- 63 virišķā: sākas putekšņu izbiršana
- sievīšķā: drīksnu galiņi redzami ārpus vāļītes

7. graudu veidošanās

- 79 gandrīz visi graudi sasnieguši pilnu izmēru

8. nogatavošanās

- 89 graudi pilnībā gatavi: graudi cieti un spoži, sausas saturs ap 65%


9. vecums

- 99 pilngatavība – graudi gatavi nākamajam ciklam

* lapu uzskata par atritinājušos, kad lapas apakle ir redzama vai arī kad nākamās lapas galotne ir redzama (atkarībā no tā, vai lapas skaita atbilstoši "apakles" metodei vai "noliekušos lapu metodei").

** stiebrošana var sākties ātrāk nekā tad, kad 9 lapas ir atritinājušās; (tādā gadījumā attīstība turpinās ar 3. galveno attīstības stadiju).

*** kukurūzai skara var parādīties ātrāk (tādā gadījumā attīstība turpinās ar 5. galveno attīstības stadiju).



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:



zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:

palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā būtisks ražas pieaugums

AAL augu aizsardzības līdzekļi

AS augu attīstības stadija

VAV vīrsmas aktīvā viela



fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts



īpaši augsta lietus noturība



aptver visu slimību spektru