



Clearfield®
Rapsu audzēšanas tehnoloģija

BASF
We create chemistry

Vasaras rapsis

CLEARFIELD audzēšanas tehnoloģijai

2026

Fungicīdi

- * iesakam lietot sējumos, kuros augsts ražas potenciāls
- ** pie augsta slimību riska lietot lielāko ieteikto devu

Caryx® 0,7 l/ha*
Architect® 1,0 – 2,0 l/ha

Revydas® 0,6 – 1,0 l/ha**
Pictor® Active 0,6 – 1,0 l/ha**



Herbicīdi

Cleravo® Flex 1,4 – 2,0 l/ha
Clamox® 1,4 l/ha + **Dash®** 1,0 l/ha



Limacīds
Ironmax® Pro 7 kg/ha



00 05 10 11 12 14 18 32 51 55-57 59-61 63-65 69 89

Clearfield tehnoloģijas herbicīdi ir efektīvi pret nozīmīgākajam nezālēm, tai skaitā krustziežu nezālēm un labības sārgaugiem.

Clamox®

Darbīgās vielas: metazahloris 375 g/l
imazamoks 17,5 g/l

Herbicīds Clamox ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīdos, ko apzīmē ar burtiem CL pie šķirnes nosaukuma

Iedarbība: caur saknēm, dīgstiem un lapām

- piemērots pie dažādām augsnes apstrādes metodēm un augšnes tiptiem
- efektīvs jebkuros augsnes mitruma apstākļos
- ar vienu apstrādi ierobežo divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāles tai skaitā **labību sārgaugus**
- augsta efektivitāte uz krustziežu dzimtas nezālēm, tai skaitā **lokaugļu zvēreni**
- var veidot tvertnes maisījumus ar Caryx
- saglabā iedarbību vairākus mēnešus
- **vienmēr** nepieciešams **pievienot** virsmas aktīvo vielu **Dash**

Cleravo® Flex

Darbīgās vielas: kvinmeraks 125 g/l
imazamoks 12,5 g/l
aminopiraldils 4,0 g/l

Herbicīds Cleravo Flex paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīdos, ko apzīmē ar burtiem CL pie šķirnes nosaukuma

Iedarbība: caur lapām un saknēm

- ļoti plašs ierobežojamo nezāļu spektrs (krustziežu dzimtas nezāles, rudzupuķes, kumelītes, u.c.)
- piemērots dažādām augsnes apstrādes tehnoloģijām
- elastīgs lietošanas laiks - no rapša dīgļlapu līdz 6 īsto lapu stadijai
- var veidot tvertnes maisījumus ar Caryx
- **nav** nepieciešams pievienot virsmas aktīvo vielu Dash

Caryx®

Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds 210 g/l
metkonazols 30 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

- uzlabo stublāju veldres noturību
- veicina zarošanos – vairāk sānzari un pākstis
- ierobežo agrīnu sausplankumainību un sauso puvi
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana
- augstākām rezultātiem optimāls apstrādes laiks, kad augs sasniedzis 25 cm garumu

Architect®

Darbīgā viela: piraklostrobīns 100 g/l
kalcija proheksadions 25 g/l
mepikvāta hlorīds 150 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbības fungicīds un augu augšanas regulators

Pavasarī:

- uzlabo stublāju veldres noturību, sālsina to garumu
- veicina zarošanos – vairāk sānzari un pākstis
- ierobežo sausās puves un krustziežu gaišplankumainības izplatību
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana

Pictor Active®

Darbīgā viela: boskalīds 150 g/l
piraklostrobīns 250 g/l

Iedarbība: translamināra un sistēmas

- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- palielina 1000 sēklu svaru un ražu
- samazināts pākšu atvēršanās risks
- veicina augu stresa noturību
- pozitīvs fizioloģiskais efekts – vienmērīga ziedēšana un nogatavošanās
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL un lapu mēslojumiem

Revydas®

Darbīgā viela: mefentritrifu konazols (Revsol) 100 g/l
boskalīds 200 g/l

Iedarbība: translamināra ar aizsargājošu efektu

- pirmais fungicīds rapši, kas satur darbīgo vielu Revysol®
- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- ilgāks apstrādes periods un ilgstoša iedarbība
- izcila lietus noturība
- nodrošina augstāku ražu iegūšanu
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL

Ironmax[®] Pro

Darbīgā viela: dzelzs (III) fosfāts 24,2 g/kg

Iedarbība: ēsmas granulas


Ierobežojamie organismi: kailgliemeži un mīkstgliemeži.

- lieliska izkliedējamība
- ēsma pievilina gliemežus
- teicama lietus noturība
- nav kaitīgs sliekām!

Limacīds

Rapša attīstības stadijas pēc BBCH skalas

- | | |
|-------|--|
| 00 | sausā sēkla |
| 05 | diļšaknes parādīšanās |
| 10 | diļšlapu parādīšanās virs augsnes |
| 11 | pirmā lapa atvērusies |
| 12 | divas īstās lapas |
| 14 | četras īstās lapas |
| 18 | astoņas īstās lapas |
| 32 | divi posmi saredzami |
| 51 | pirmie ziedpumpuri saredzami (zaļie pumpuri) |
| 55/57 | atsevišķi ziedpumpuri galvenajā un sekundārajā ziedkopā pacēlušies, bet vēl nav atvērušies |
| 61 | 10% ziedu uz galvenā dzinuma atvērušies |
| 65 | pilnzieds – 50% ziedu uz galvenā dzinuma atvērušies, birst vecākās ziedlapas |
| 69 | ziedēšanas beigas |
| 89 | pilngatavība: gandrīz visi pāksteri nogatavojušies, sēklas cietas un tumšas |



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:



zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:
palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā būtisks ražas pieaugums



fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts



īpaši augsta lietus noturība



aptver visu slimību spektru

AAL augu aizsardzības līdzekļi

AS augu attīstības stadija

VAV vīrsmas aktīvā viela