

Ziemas rapsis

2026

Augu aizsardzības shēma konvencionālajai audzēšanas tehnoloģijai



Fungicīdi

Caryx® 0,7 – 1,2 l/ha
Revyona® 1,0 l/ha*
Juventus® 90 0,5 l/ha

Caryx® 0,7 – 1,0 l/ha
Revyona® 1,0 l/ha*
Juventus® 90 0,5 l/ha
Architect® 1,0 – 2,0 l/ha

Revydas® 0,6 – 1,0 l/ha
Pictor® Active 0,6 – 1 vai 2x 0,5 l/ha

* Verticilārās vītes riska gadījumā izvēlēties Revyona®, kombinācijā ar augšanas regulējošu preparātu, piemēram Juventus® 90 vai Medax® Top.

Herbicīdi

Focus® Ultra 1,0 – 2,0 l/ha + **Dash®** 0,5 – 1,0 l/ha*

Butisan® Avant 2,0-2,5 l/ha līdz rapša sadiģšanai; 1,8 l/ha pēc rapša sadiģšanas**

Butisan® Star 2,0 – 2,25 l/ha**


** Var veidot tvertnes maisījumu ar Focus® Ultra nepievienojot Dash®, ja sakrīt apstrādes laiki

* Izvēlēties situācijās, ja nepieciešams ierobežot airenus.



Limacīds

Ironmax® Pro 7 kg/ha



Butisan® Avant

Darbigās vielas: dimetēnamids-P 100 g/l
kvinneraks 100 g/l
metazahlorš 300 g/l

Iedarbība: caur saknēm un dīgstiem

- pirmais rapša herbicīds ar trīs darbīgām vielām
- saudzīgs kultūraugam
- elastīgs apstrādes laiks (tūlīt pēc sējas līdz nezāļu dīgļlapu stadijai)
- saglabā iedarbību vairākus mēnešus
- plašs iedarbības spektrs uz divdīgļlapju un īsmūža viendīgļlapju nezālēm
- paplašināts ierobežojamo nezāļu spektrs t.sk.: gandrenes, ķeraļu madaras, žodzenes, magones
- uzlabota efektivitāte per krustziežu dzimtas nezālēm
- var veidot tvertnes maisījumu ar Focus® Ultra nepievienojot Dash®, ja sakrīt apstrādes laiki
- herbicīda efektivitāte mazāk atkarīga no augsnes mitruma un augsnes tipa
- nav ierobežojumi nākamā gada kultūraugu izvēlei

Butisan® Star

Darbigās vielas: metazahlorš 333 g/l
kvinneraks 83 g/l

Iedarbība: caur saknēm un dīgstiem

- saudzīgs kultūraugam
- elastīgs apstrādes laiks uz lauka (tūlīt pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai)
- saglabā iedarbību vairākus mēnešus
- plašs iedarbības spektrs uz divdīgļlapju un īsmūža viendīgļlapju nezālēm
- īpaši piemērots ar **ķeraļu madaru, kumelīti un zīda magoni** piesāņotos laukos
- var veidot tvertnes maisījumu ar Focus® Ultra, nepievienojot Dash®, ja sakrīt apstrādes laiki
- optimāls augsnes mitrums veicina herbicīda efektivitāti
- nav ierobežojumi nākamā gada kultūraugu izvēlei

Focus® Ultra + Dash®

Darbigā viela: cikloksidims 100 g/l

Iedarbība: caur lapām

- ātri iekļūst augā, augšana apstājas jau pirmajā dienā
- darbojas efektīvi pie relatīvi zemas temperatūras (+8 °C)
- piemērots ziemas rapša sējumos pret pabiru graudaugiem rudenī
- saudzīgākais no graminicīdiem pret kultūraugu
- mazāka deva pateicoties Dash® efektam
- lietojams arī tvertnes maisījumā ar rapša herbicīdiem nepievienojot Dash®

Dash®

- samitrina lapu virsmu, veicina preparāta pielipšanu pie lapas
- palīdz iekļūt darbīgajai vielai augā, veicina ātrāku iedarbību
- nodrošina optimālu efektivitāti visos apstākļos



Darbīgās vielas: mepikvāta hlorīds 210 g/l
metkonazols 30 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

Rudeni

- lielāks sakņu diametrs un sakņu garums, spēcīgākas sānsaknes:
 - uzlabo pārziemošanu,
 - labāka augu apgāde ar barības vielām
 - augstāka augu izturība kritiskos laika apstākļos
 - ātrāka veģetācijas atsākšanās pavasarī
- notur augšanas punktu tuvāk augsnei
- ilgstoša spēja noturēt augšanas punktu arī garos rudenos
- lielāka augu vitalitāte, augstāks hlorofila saturs augā
- ierobežo sausās puves un krustziežu sausplankumainības attīstību
- elastīgs lietošanas laiks

Pavasari

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos- vairāk sānzari un pākstis
- agrīna sausplankumainības un sausās puves kontrole
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana
- augstākām rezultātiem optimāls apstrādes laiks, kad augs sasniedzis 25 cm garumu



**Darbīgā
viela:** mefentriflukonazols (Revysoļ) 100 g/l
boskalīds 200 g/l

Iedarbība: translamināra ar aizsargājošu efektu

- pirmais fungicīds rapsī, kas satur darbīgo vielu Revysoļ®
- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- ilgāks apstrādes periods un ilgstoša iedarbība
- izcila lietus noturība
- nodrošina augstāku ražu iegūšanu
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL



**Darbīgā
viela:** mefentriflukonazols (Revysoļ) 75 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

- efektīvs pret nozīmīgākajām krustziežu slimībām
- blakus efekts pret verticilāro vīti
- elastīgs lietošanas laiks
- izcila lietus noturība

Juventus® 90

Darbīgā viela: metkonazols 90 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

Rudeni

- lielāks sakņu diametrs un sakņu garums, spēcīgākas sānsaknes:
 - uzlabo pārziemošanu
 - labāka augu apgāde ar barības vielām
 - lielāka izturība pret izcilašanu pavasarī
 - ātrāka veģetācijas atsākšanās pavasarī
- notur augšanas centru tuvāk augsnei
- lielāka auga vitalitāte, augstāks hlorofila saturs augā
- ierobežo sausās puves un krustziežu sausplankumainības attīstību

Pavasari

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos - vairāk sānzari un pākstis
- profilaktiski ierobežo sausplankumainību, pelēko puvi
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana



**Darbīgā
viela:** boskalīds 150 g/l
piraklostrobīns 250 g/l

Iedarbība: translamināra un sistēmas

- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- palielina 1000 sēklu svaru un ražu
- samazināts pākšu atvēršanās risks
- veicina augu stresa noturību
- pozitīvs fizioloģiskais efekts – vienmērīga ziedēšana un nogatavošanās
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL un lapu mēslojumiem



**Darbīgā
viela:** piraklostrobīns 100 g/l
kalcija proheksadions 25 g/l
mepikvāta hlorīds 150 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbības fungicīds un augu augšanas regulators

Rudeni:

- lielāks sakņu diametrs un sakņu garums, spēcīgākas sānsaknes:
 - uzlabo pārziemošanu,
 - labāka augu apgāde ar barības vielām
 - ātrāka veģetācijas atsākšanās pavasarī
- notur augšanas punktu tuvāk augsnei
- lielāka auga vitalitāte
- ierobežo sausās puves attīstību

Pavasari:

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos - vairāk sānzari un pākstis
- ierobežo sausās puves un krustziežu gaišplankumainības izplatību
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana

Ironmax® Pro

Darbigā vielā: dzelzs (III) fosfāts 24,2 g/kg


Iedarbība: ēsmas granulas

Ierobežojamie organismi: kailgliemeži un mīkstgliemeži

- lieliska izkliedējamība
- ēsma pievīlina gliemežus
- teicama lietus noturība
- nav kaitīgs sliekām!

Rapša attīstības stadijas pēc BBCH skalas

00	sausā sēkla
05	diģisaknes parādīšanās
10	diģļlapu parādīšanās virs augsnes
11	pirmā lapa atvērusies
12	divas istās lapas
14	četras istās lapas
18	astoņas istās lapas
32	divi posmi saredzami
51	pirmie ziedpumpuri saredzami (zaļie pumpuri)
55/57	atsevišķi ziedpumpuri galvenajā un sekundārajā ziedkopā pacēlušies, bet vēl nav atvērušies
61	10% ziedu uz galvenā dzinuma atvērušies
65	pilnzieds – 50% ziedu uz galvenā dzinuma atvērušies, birst vecākās ziedlapas
69	ziedēšanas beigas
89	pilngatavība: gandrīz visi pāksteņi nogatavojušies, sēklas cietas un tumšas



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:

 zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:
palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot
mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā
būtisks ražas pieaugums

AAL augu aizsardzības līdzekļi
AS augu attīstības stadija
VAV vīrsmas aktīvā viela

 fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts

 īpaši augsta lietus noturība

 aptver visu slimību spektru