



Clearfield®
Rapsu audzēšanas tehnoloģija


BASF
We create chemistry

Ziemas rapsis

CLEARFIELD audzēšanas tehnoloģijai

2026

Fungicīdi



* Sējumos, kuros augsts ražas potenciāls vai sabiezinātos sējumos



Herbicīds

Cleravo® Flex 2,0 l/ha


Apstrādi ar Cleravo® Flex veikt
1 reizi sezonā – rudenī **vai** pavasarī

Clamox® 1,2 l/ha + **Dash®** 1,0 – 1,2 l/ha



Limacīds

Ironmax® Pro 7 kg/ha



Clearfield tehnoloģijas herbicīdi ir efektīvi pret nozīmīgākajām nezālēm, tai skaitā krustziežu nezālēm un labības sārņaugiem.

Clamox®

Darbīgās vielas: metazahloris 375 g/l
imazamoks 17,5 g/l

Herbicīds Clamox ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīdos, ko apzīmē ar burtiem CL pie šķirnes nosaukuma

Iedarbība: caur saknēm, dīgstiem un lapām

- piemērots pie dažādām augsnes apstrādes metodēm un augsnes tiptiem
- efektīvs jebkuros augsnes mitruma apstākļos
- ar vienu apstrādi ierobežo divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāles tai skaitā **labību sārņaugus**
- augsta efektivitāte uz krustziežu dzimtas nezālēm, tai skaitā **lokaugļu zvēreni**
- var veidot tvertnes maisījumus ar Caryx
- saglabā iedarbību vairākus mēnešus
- **vienmēr** nepieciešams **pievienot** vīrsmas aktīvo vielu **Dash**

Cleravo® Flex

Darbīgās vielas: kvinmeraks 125 g/l
imazamoks 12,5 g/l
aminopiralīds 4,0 g/l

Herbicīds Cleravo Flex paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīdos, ko apzīmē ar burtiem CL pie šķirnes nosaukuma

Iedarbība: caur lapām un saknēm

- ļoti plašs ierobežojamo nezāļu spektrs (krustziežu dzimtas nezāles, rudzupuķes, kumelītes, u.c.)
- piemērots dažādām augsnes apstrādes tehnoloģijām
- elastīgs lietošanas laiks - no rapša dīgļlapu līdz 6 īsto lapu stadijai
- var veidot tvertnes maisījumus ar Caryx
- **nav** nepieciešams pievienot vīrsmas aktīvo vielu Dash

Caryx® 

Darbigās vielas: mepikvāta hlorīds 210 g/l
metkonazols 30 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

Pavasari

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos – vairāk sānzari un pākstis
- agrīna sausplankumainības un sausās puves kontrole
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana
- augstākam rezultātam optimāls apstrādes laiks, kad augs sasniedzis 25 cm garumu

Pictor Active® 

Darbigā viela: boskalīds 150 g/l
piraklostrobīns 250 g/l

Iedarbība: translamināra un sistēmas

- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- palielina 1000 sēklu svaru un ražu
- samazināts pākšu atvēršanās risks
- veicina augu stresa noturību
- pozitīvs fizioloģiskais efekts – vienmērīga ziedēšana un nogatavošanās
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL un lapu mēslojumiem

Juventus® 90

Darbigā viela: metkonazols 90 g/l

Iedarbība: sistēmas ar aizsargājošu efektu

Pavasari

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos – vairāk zari un pākstis
- profilaktiski ierobežo sausplankumainību, pelēko puvi
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražasnovākšana

Ziedēšanas vidus

- ierobežo krustziežu sausplankumainību, pelēko puvi un balto puvi

Revydas® 

Darbigā viela: mefentriflukonazols (Revsol) 100 g/l
boskalīds 200 g/l

Iedarbība: translamināra ar aizsargājošu efektu

- pirmais fungicīds rapši, kas satur darbīgo vielu Revsol®
- augsta efektivitāte pret balto puvi un krustziežu sausplankumainību
- ilgāks apstrādes periods un ilgstoša iedarbība
- izcila lietus noturība
- nodrošina augstāku ražu iegūšanu
- lietojams tvertnes maisījumos ar citiem AAL

Architect® 

Darbigā viela: piraklostrobīns 100 g/l
kalcija proheksadions 25 g/l
mepikvāta hlorīds 150 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbības fungicīds un augu augšanas regulators

Rudeni:

- lielāks sakņu diametrs un sakņu garums, spēcīgākas sānsaknes:
 - uzlabo pārziemošanu,
 - labāka augu apgāde ar barības vielām
 - ātrāka veģetācijas atsākšanās pavasarī
- notur augšanas punktu tuvāk augsnei
- lielāka auga vitalitāte
- ierobežo sausās puves attīstību

Pavasari:

- uzlabo stublāju veldres noturību, saīsina to garumu
- veicina zarošanos – vairāk sānzari un pākstis
- ierobežo sausās puves un krustziežu gaišplankumainības izplatību
- vienmērīgāka nogatavošanās un atvieglota ražas novākšana

Fungicīdi

Ironmax® Pro

Darbigā viela: dzelzs (III) fosfāts 24,2 g/kg

Iedarbība: ēsmas granulas

Ierobežojamie organismi: kailgliemeži un mīkstgliemeži

- lieliska izkliedējamība
- ēsma pievilkina gliemežus
- teicama lietus noturība
- nav kaitīgs sliekām!

Limacīds

Rapša attīstības stadijas pēc BBCH skalas

- 00 sausa sēkla
05 dīglsaknes parādīšanās
10 dīgļlapu parādīšanās virs augsnes
11 pirmā lapa atvērusies
12 divas 1stās lapas
14 četras 1stās lapas
18 astoņas 1stās lapas
32 divi posmi saredzami
51 pirmie ziedpumpuri saredzami (zaļie pumpuri)
55/57 atsevišķi ziedpumpuri galvenajā un sekundārajā
ziedkopā pacēlušies, bet vēl nav atvērušies
61 10% ziedu uz galvenā dzinuma atvērušies
65 pilnzieds – 50% ziedu uz galvenā dzinuma atvērušies,
birst vecākās ziedlapas
69 ziedēšanas beigas
89 pilngatavība: gandrīz visi pāksteņi nogatavojušies,
sēklas cietas un tumšas



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:



zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:
palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot
mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā
būtisks ražas pieaugums



fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts



īpaši augsta lietus noturība



aptver visu slimību spektru

AAL augu aizsardzības līdzekļi
AS augu attīstības stadija
VAV vīrsmas aktīvā viela