Lauka pupas

Augu aizsardzības shēma

2026

Fungicīdi

Pictor® Active 0,6 – 1,0 l/ha vai dalīti 2x0,5 l/ha
Signum® 0,75 – 1,0 kg/ha vai dalīti 2x0,5 kg/ha

Herbicīdi

Stomp® 2,0 l/ha
Conaxis® 1,0 – 1,5 l/ha


Corum® 1,0 l/ha **+ Dash®** 1,0 l/ha

vai

dalīti 2 reizes **Corum®** 0,625 l/ha **+ Dash®** 0,5 l/ha

vai

Corum® 1,0 – 1,25 l/ha **+ Dash®** 1,0 l/ha



Atbilstoši situācijai konkrētajā tīrumā izvēlēties piemērotāko no ieteiktajiem AAL risinājumiem.

Pirms preperāta lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju!

Fungicīdi

Signum®

Darbīgās vielas: boskalīds 26,7%
piraklostrobīns 6,7%

Iedarbība: translaminārā un sistēmas, ar aizsargājošu efektu

- efektīvs pret rūsām, iedegām, pelēko puvi
- apsrādi veic ziedēšanas sākumā

Ieguvumi: lielāka raža, tīrs sēklas materiāls

Pictor Active®

Darbīgā viela: boskalīds 150 g/l
piraklostrobīns 250 g/l

Iedarbība: translaminārā un sistēmas

- efektīvs pret nozīmīgākajām pākšaugu slimībām
- veicina augu stresa noturību
- iespējams veikt vienu apstrādi vai dalīti

Ieguvumi: lielāka raža, tīrs sēklas materiāls

Herbicīdi

Corum® + Dash®

Darbīgās vielas: imazamokss 22,4 g/l
bentazons 480 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbība caur augu zaļajām lapām un arī caur saknēm

- lietojams zirņu, lauka pupu, sojas, dārza pupiņu un lēcu sējumos
- apstrāde veicama sākot no kultūrauga divu līdz deviņu lapu atttīstības stadijai
- augsta efektivitāte pret daudzām nozīmīgām divdīgļlapju nezāļu sugām
- iespējams veikt vienu apstrādi vai lietot dalīti

Dash®

- samitrina lapu virsmu, veicina preparāta pielipšanu pie lapas
- palīdz iekļūt darbīgajai vielai augā, veicina ātrāku iedarbību
- nodrošina optimālu efektivitāti visos apstākļos

Stomp® CS

Darbīgā viela: pendimetalīns 455 g/l

Iedarbība: sistēmas iedarbība, caur augsni un dīgstiem

- lietojams graudaugos ar tauriņziežu pasēju, tauriņziežos un kukurūzā
- efektīvs pret īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm, lietojot optimālos augsnes mitruma apstākļos
- augsta efektivitāte pret viendīgļlapjiem: rudzusmilgu, maura skareni, tīruma lapsasti
- īpaši piemērots, ja galvenā problēma ir tīruma vijolīte (1,5 l/ha)
- augsta efektivitāte pret plašu divdīgļlapju nezāļu spektru (variē no lietotās devas)

Conaxis®

Darbīgās vielas: dimetēnamīds–P 400 g/l
klomazons 50 g/L

Iedarbība: sistēmas iedarbība caur augsni

- lietojams pēc kultūrauga sējas pirms tā sadīgšanas
- spēcīgs sākums nezāļu ierobežošanas programmā tauriņziežos
- augsta efektivitāte pret atsevišķām viendīgļlapju nezālēm (gaiļsāre)
- efektīvs pret daudzām nozīmīgām divdīgļlapju nezāļu sugām
- laba efektivitāte arī sausākos laikapstākļos

Lauka pupu attīstības stadijas pēc BBCH skalas

00	sausa sēkla
05	dīgļsaknes parādīšanās
09	dīgļlapu parādīšanās virs augsnes
10	redzams pirmais lapu pāris
11	pirmā lapa atvērusies
15 – 35	stublāja augšana un sāndzinumu veidošanās
51	pirmie ziedpumpuri saredzami
61	uz pirmajām ziedkopām ziedi atvērušies
71	10% pākšu sasniegušas galīgo garumu
89	Pilngatavība: gandrīz visas pākstis tumšas, sēklas sausas un cietas



Izmantotie apzīmējumi un paskaidrojumi:

zaļēšanas un fizioloģisko procesu stimulējošs efekts:
palīdz augam stresa situācijās (piemēram ilgstošs sausums) labāk izmantot mēslojumu, absorbēt saules enerģiju, uzlabo ūdens apgādi augā, kā rezultātā būtisks ražas pieaugums

fizioloģiskos procesus stimulējošs efekts

īpaši augsta lietus noturība

aptver visu slimību spektru

AAL	augu aizsardzības līdzekļi
AS	augu attīstības stadija
VAV	virsmas aktīvā viela